

CHAVARRIAS Y BUITRE DE CIENAGA

ANHIMIDAE

Sólo tres especies, exclusivas de América del Sur, componen esta familia de aves acuáticas corpulentas, con patas grandes no palmeadas y grandes espolones alares. Son fundamentalmente vegetarianas y buscan su alimento en lagunas de poca profundidad con abundancia de vegetación herbácea acuática. Sus polluelos están cubiertos por un denso plumón y se parecen a los gansos pequeños. Tienen voz potente.

Buitre de Ciénaga o Jamuco (*Anhima cornuta*). 90 cm. De color negruzco, con una pechera escamada de blanco y negro, es inconfundible por su apariencia general, su gran tamaño y un largo «cuerno» en la frente, formado por una pluma modificada. Solitario o en parejas, se alimenta en las orillas de la laguna o reposa en árboles aislados. Su grito potente da origen al nombre de «Jamuco». La Laguna de Sonso es uno de los pocos sitios en el occidente colombiano donde se encuentra esta especie.


PATOS Y GANSOS

ANATIDAE


Acuáticas por excelencia, patos y gansos son aves inconfundibles por sus patas palmeadas y pico aplanado provisto de una «uña» en el extremo. La mayoría se alimenta de partes tiernas de plantas, semillas y pequeños invertebrados acuáticos que obtienen filtrando con sus picos el cieno de las lagunas. Unas pocas especies se alimentan de peces. En general su vuelo es potente y directo, son buenos nadadores y pueden andar en tierra firme sin dificultad.

Iguasa María (*Dendrocygna bicolor*). 50 cm. En general café claro, las alas más oscuras. Pico y patas gris oscuro. En vuelo es muy visible una banda blanquecina en la rabadilla. Muy gregario y ruidoso, llega a formar grandes bandadas.

Iguasa Común (*Dendrocygna autumnalis*). 50 cm. Café, con pecho y abdomen negros. Pico y patas rosados. En vuelo exhibe las alas negras con grandes parches blancos. En comportamiento general es muy similar a la especie anterior, en cuya compañía se ve con frecuencia.



1. Buitre de Ciénaga o Jamuco, 2. Iguasa Común, 3. Iguasa Marfá.




Pato Careto, Zarceta (*Anas discors*) (M). 38 cm. El macho es café punteado de negro en pecho y abdomen, con la cabeza grisácea y una medialuna blanca frente a los ojos, a veces muy tenue o ausente al principio de la migración (Septiembre a Diciembre). En vuelo muestra una extensa mancha azul en las alas. La hembra es similar pero no tiene la medialuna facial. Se encuentra en la Laguna de Sonso entre Septiembre y Abril, a veces en grandes bandadas. A lo largo del día reposa a la orilla de la laguna y en aguas poco profundas.

Pato Colorado, Zarceta Canela (*Anas cyanoptera*). 40 cm. El macho es de color canela rojizo muy brillante, con ojos rojos. En vuelo muestra una extensa mancha azul en las alas. La hembra es muy similar a la del Pato Careto. Se encuentra en parejas y pequeños grupos durante todo el año en los mismos sitios que la especie anterior, pero es probable que también lleguen algunos individuos del norte durante la migración.

Pato Cucharo (*Anas clypeata*) (M). 45 cm. Pico muy prominente, relativamente largo y muy ancho en el extremo. El macho tiene la cabeza y el cuello verde brillante, el pecho blanco y el abdomen café castaño, con un mancha blanca atrás en los flancos. La hembra es café claro con abundante moteado más oscuro. Ambos sexos muestran en vuelo una extensa mancha azul en las alas. Sólo se encuentra ocasionalmente en la Laguna.

Pato Brasileiro (*Sarkidiornis melanotos*). Macho: 76 cm. Pico con una cresta negra y carnosa, muy prominente. Todo blanco en las partes inferiores y negro lustroso con visos verdes por encima, la cabeza blanca moteada de negro. La hembra es mucho más pequeña (56 cm) y sin la cresta del pico, pero de coloración similar. Es inconfundible por tamaño y coloración. Muy escaso.

Pato Encapuchado (*Oxyura dominica*). 34 cm. Macho en plumaje nupcial: pico muy grande azul celeste, cara negra, resto café castaño, más oscuro en el cuello. Hembra y macho en plumaje no reproductivo: café muy claro con barrado más oscuro; línea ocular negruzca bordeada arriba y abajo por listas más claras. Generalmente se encuentra muy quieto y escondido entre vegetación flotante de pequeñas charcas, a veces en grandes números.



1. Pato Careto, Zarceta, 2. Pato Brasileiro, 3. Pato Colorado, Zarceta Canela,
4. Pato Encapuchado, a. Macho, b. Hembra, 5. Pato Cucharo.

