

GALLINAZOS Y GUALAS

CATHARTIDAE

Pertenecen a esta familia de aves carroñeras el Cóndor de los Andes (*Vultur gryphus*) y el Rey de los Gallinazos (*Sarcorhamphus papa*). La piel de la cabeza es desnuda y gruesa, en algunas especies con ornamentos como crestas y carúnculas. Pico fuerte y ganchudo, apto para desgarrar piel y carne de animales muertos. Las patas son grandes pero no tienen las garras fuertes y agudas de las verdaderas rapaces. Su agudeza visual es notable.

Gallinazo, Chulo (*Coragyps atratus*). 60 cm. Piel desnuda de la cabeza y el cuello, gris oscuro. Plumaje negro. En vuelo las alas se ven negras con sólo el extremo blanquecino. Cola corta y ancha. A veces se reúnen en grandes grupos en la vecindad de animales muertos, o bajan por el río sobre cadáveres flotantes.

Guala Común (*Cathartes aura*). 70 cm. Piel desnuda de la cabeza y el cuello, roja. Plumaje uniforme café negruzco. Planea lentamente y a baja altura con las alas formando una «V» muy abierta y a veces parece mecerse hacia los lados. En vuelo las alas se ven gris claro en toda su longitud. La cola es relativamente larga y estrecha.

AGUILA PESCADORA

PANDIONIDAE

Esta familia incluye una sola especie de distribución mundial. Además de alimentarse exclusivamente de peces, se distingue de otras rapaces por su capacidad de reversar el cuarto dedo, lo cual le permite sujetar sus presas con mayor firmeza.

Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*) (M). 60 cm. Toda blanca por debajo, pardo oscuro por encima. En vuelo muestra una mancha negra en el doblar de las alas y barras oscuras finas en las remeras y barras negras y blancas en las timoneras. Coronilla blanca y área ocular negra en forma de antifaz. Vuela a baja altura sobre el agua y con frecuencia se queda aleteando suspendida antes de bajar en picada y capturar algún pez. Puede verse en la Laguna durante todo el año pero es más abundante en época de migración (Septiembre a Abril).



1. Aguila Pescadora, 2. Gallinazo, Chulo, 3. Guala Común.