

Son rapaces en general de cuerpo esbelto y alas largas y agudas, de vuelo muy veloz y, al igual que las águilas, provistas de picos agudos y curvos y fuertes garras. Su agudeza visual es notable. El Guaraguao Común y la Pigua, además de sus hábitos parcialmente carroñeros, se apartan de la forma típica por sus alas más anchas y vuelo más lento.

Pigua (*Milvago chimachima*). 45 cm. Por encima café parduzco; cabeza, cuello y partes inferiores blanco crema. En vuelo muestra los extremos de las alas blancos. Con frecuencia acompaña al ganado. Anda por el suelo en busca de insectos y animales muertos. Grito estridente y quejumbroso.

Guaraguao Común, Caracas (*Polyborus plancus*). 55 cm. Cresta negra prominente y piel facial desnuda roja. Cara y cuello blancos, pecho y espalda con barrado fino de blanco y negro. Resto de partes superiores e inferiores, negro. Cola blanca con barrado negro y banda terminal negra. En vuelo los extremos de las alas se ven blancos con tenue barrado negro. Se alimenta de insectos, pequeños vertebrados y carroña que encuentra en el suelo en potreros y arados.

Cernícalo (*Falco sparverius*). 25 cm. Macho: Una línea vertical negra debajo del ojo y otra detrás. Mancha circular negra a los lados de la nuca. Café rojizo barrado de negro por encima. Alas y coronilla azul grisáceo. Cuello y partes inferiores canela claro con los flancos punteados de negro. Hembra: se distingue del macho por color general rufo, barrado de negro en alas y espalda; partes inferiores canela claro estriado de café oscuro. El halcón más común en zonas urbanizadas y terreno abierto. Se posa en árboles y edificios altos.

Esmerejón (*Falco columbarius*) (M). 30 cm. Macho: partes superiores, incluida la coronilla, gris plumizo; cara y partes inferiores blanco crema con estrías café. Hembra: similar al macho pero con partes superiores café. No es común en la Laguna y es poco conspicuo. Vuelo muy veloz y a baja altura. Caza aves pequeñas.

Halcón Peregrino (Halcón Patero) (*Falco peregrinus*) (M). 45 cm. Coronilla, nuca y línea debajo del ojo, negras; partes superiores gris plumizo; garganta blanca; partes inferiores crema barrado de café. Alas largas y muy agudas. Se posa en árboles altos; persigue a sus presas a velocidades sorprendentes.



1. Pigua, 2. Cernicalo, 3. Guaragua Común, Caracas.

Halcón Plomizo (*Falco femoralis*). 40 cm. Partes superiores azul plumizo, con una banda blanquecina que circunda la coronilla y una línea negra debajo del ojo; alto pecho blanco; banda pectoral negra extendida a los flancos barrada de blanco y abdomen rufo. Se posa expuesto en árboles altos y hace vuelos rasantes y rápidos en persecución de otras aves.

PERDICES

PHASIANIDAE

A esta familia pertenecen aves tan conocidas como las gallinas, los faisanes y los pavos reales. En el grupo de las perdices el pico es corto, grueso y fuerte; el cuerpo es robusto, las patas fuertes, las alas cortas y redondeadas y la cola muy corta. Son terrestres pero cuando se sienten amenazadas vuelan repentinamente con aleteo muy ruidoso. Se alimentan de semillas, brotes tiernos de plantas, e insectos.

Perdiz Común (*Colinus cristatus*). 20 cm. Aspecto rechoncho y cola corta. Macho: cresta blanquecina prominente. Partes superiores en general café oscuro con aspecto escamado. Pecho y abdomen castaño con abundantes manchas blancas circulares. La hembra es similar, más opaca y con cresta café. Andan en parejas o pequeños grupos familiares por potreros y matorrales.

CARRAO

ARAMIDAE

Carrao (*Aramus guarauna*). 65 cm. Es la única especie en esta familia. Su forma general recuerda a un Ibis, pero es más robusto y su pico es más grueso y más recto. Café oscuro en general, con estrías blancas en cuello, pecho y espalda. Pico amarillo con el extremo negro. Vuelo corto, pesado y lento. Se alimenta de caracoles que encuentra entre vegetación acuática emergente y densa. Su grito característico y potente («ca-rra-o, ca-rra-o»), se escucha con frecuencia.



1. Esmerejón, 2. Halcón Peregrino (Halcón Patero), 3. Halcón Plumizo.

