

Aves generalmente acuáticas, de apariencia robusta, cuello corto, cabeza pequeña y patas largas. En algunas el pico es relativamente largo. Mientras ciertas especies prefieren ambientes abiertos, otras viven exclusivamente entre vegetación acuática densa y son de muy difícil observación. La mayoría tienen alas cortas y son pobres voladoras pero algunas nadan bien y otras caminan con agilidad por entre vegetación densa.

Rascón Caucano (*Pardirallus nigricans*). 28 cm. Partes superiores café oscuro. Cabeza y partes inferiores gris pizarra, abdomen negro. Pico amarillo, relativamente largo. Patas rojas. Muy arisco, a veces se expone brevemente cerca de vegetación densa a la orilla de lagunas y pequeños caños.

Polla Azul (*Porphyrio martinica*). 33 cm. Azul iridiscente con visos púrpura; cola blanca por debajo. Pico rojo con extremo amarillo y escudo frontal azul claro. Patas amarillas. Gracias a sus largos dedos camina sobre vegetación flotante y sólo nada ocasionalmente; prefiere sitios cercanos a matorrales densos.

Polla Gris (*Gallinula chloropus*). 35 cm. Gris en general, con la cabeza y el cuello más oscuros y una lista blanca en los flancos. Escudo frontal y pico rojos, este último con el extremo amarillo. Patas verdosas con una banda roja arriba del talón. Nada bien y camina sobre la vegetación flotante.

Focha Común (*Fulica americana*). 35 cm. Más robusta que la especie anterior. Gris pizarra en general, cabeza y cuello más oscuros. Pico blanco con un anillo oscuro incompleto cerca del extremo. Escudo frontal pequeño de color castaño. Los dedos tienen amplias membranas laterales. Por lo general se ve nadando en parejas o bandadas pequeñas, en aguas abiertas.



1. Carrao, 2. Rascón Caucano, 3. Perdiz Común.

