

GALLITOS DE CIENAGA

JACANIDAE

Gallito de Ciénaga (*Jacana jacana*). 25 cm. En Colombia es la única especie de su familia. En proporciones generales se asemeja a las Pollas de Agua, aunque algo más esbelto y tiene patas, uñas y dedos desproporcionadamente largos. Pico amarillo; carúnculas a los lados del pico y escudo frontal dividido en dos, rojos. Negro en cabeza, cuello y partes inferiores. Espalda y alas castaño. Al volar exhibe remeras amarillas con un estrecho borde castaño. Los juveniles son café por encima y blanco amarillento debajo, con una amplia lista superciliar blanca; no tienen escudo frontal. En parejas o pequeños grupos familiares muy ruidosos, buscan alimento andando sobre la vegetación flotante.


PELLARES Y CHORLOS

CHARADRIIDAE


Con las dos familias siguientes, esta hace parte de las denominadas "aves playeras". Aunque la mayoría prefiere playas arenosas y planos lodosos de costas marinas, ríos y lagunas, algunas especies habitan terrenos secos como sabanas naturales y potreros. Son en general grandes voladoras y muchas de ellas son migratorias transcontinentales. De patas relativamente largas y picos cortos, corren con agilidad picoteando aquí y allá en busca de pequeños insectos y otros artrópodos. Aunque variables en color y tamaño, en general todos los chorlos corresponden bien en forma y proporciones a las especies aquí ilustradas.

Pellar, Caravana (*Vanellus chilensis*). 35 cm. Cresta prominente en parte posterior de la coronilla. Partes superiores café grisáceo. Frente, garganta y pecho negros, abdomen blanco. En potreros de pasto corto, aunque con frecuencia en playas y otros sustratos húmedos. En vuelo muestra extenso parche blanco en las alas sobre fondo negro. Ruidosos y gregarios.

Chorlito Colirrojo (*Charadrius vociferus*) (M). 26 cm. Además de su mayor tamaño, se distingue de los demás chorlitos por su doble banda pectoral negra y rabadilla y cola canela rojizo, este último un detalle muy conspicuo en vuelo. Muy raro en la región, se encuentra a veces en potreros de pastos cortos y en sitios arenosos lejos del agua.



1. Gallito de Ciénaga, 2. Focha Común, 3. Polla Gris, 4. Polla Azul.



Chorlito Collarejo (*Charadrius collaris*). 15 cm. Se distingue del anterior por su menor tamaño, frente blanca mucho más extensa, fuerte tinte canela en las partes superiores, collar blanco incompleto, pico todo negro y patas rosadas.

Chorlito Piquigruoso (*Charadrius wilsonius*) (M). 19 cm. Muy similar al **Chorlito Semipalmeado**, pero se distingue por su pico más largo y robusto, todo negro; patas rosadas y banda pectoral más ancha.

Chorlito Semipalmeado (*Charadrius semipalmatus*) (M). 18 cm. Extensa frente blanca que se extiende por encima y hasta detrás de los ojos y nítida banda pectoral pardusca o negra. Partes inferiores blancas. Collar blanco completo. Partes superiores gris pardusco. Pico corto y delgado, amarillo y con el extremo negro. Patas amarillas o naranja.

ANDARRIOS Y CORRELIMOS

SCOLOPACIDAE

En general son aves de cabeza pequeña, pico delgado y alargado, de longitud variable y a veces curvo, cuello relativamente largo, patas largas y figura esbelta. Su coloración es poco vistosa en el plumaje de invierno, con partes inferiores blancas y, en algunas especies, con punteado o estrías de color contrastante. Las partes superiores son grisáceas, a veces punteadas de blanco o de aspecto escamado. Ocasionalmente, al final de la época de migración, se pueden encontrar individuos en plumaje reproductivo, algo más vistoso que el plumaje de invierno. Recorren playas de arena y lodo, picoteando a profundidad variable según la longitud del pico. Todas las especies aquí descritas son migratorias transcontinentales.

Andarríos Patiamarillo (*Tringa flavipes*) (M). 27 cm. Se distingue del anterior por mayor tamaño, patas amarillas y, en vuelo, cola blanca con tenues barras oscuras. El pico es recto y de longitud aproximadamente igual a la cabeza. Muy gregario, con frecuencia se encuentra acompañado por la siguiente especie.

Andarríos Mayor (*Tringa melanoleuca*) (M). 33 cm. Muy similar al **Andarríos Patiamarillo**, incluyendo hábitos gregarios y el color de las patas y la cola. Se diferencia por su mayor tamaño, pico notablemente más largo que la cabeza y un poco recurvado (curvado hacia arriba).