

**Chorlito Collarejo** (*Charadrius collaris*). 15 cm. Se distingue del anterior por su menor tamaño, frente blanca mucho más extensa, fuerte tinte canela en las partes superiores, collar blanco incompleto, pico todo negro y patas rosadas.

**Chorlito Piquigruoso** (*Charadrius wilsonius*) (M). 19 cm. Muy similar al **Chorlito Semipalmeado**, pero se distingue por su pico más largo y robusto, todo negro; patas rosadas y banda pectoral más ancha.

**Chorlito Semipalmeado** (*Charadrius semipalmatus*) (M). 18 cm. Extensa frente blanca que se extiende por encima y hasta detrás de los ojos y nítida banda pectoral pardusca o negra. Partes inferiores blancas. Collar blanco completo. Partes superiores gris pardusco. Pico corto y delgado, amarillo y con el extremo negro. Patas amarillas o naranja.


## ANDARRIOS Y CORRELIMOS

### SCOLOPACIDAE

En general son aves de cabeza pequeña, pico delgado y alargado, de longitud variable y a veces curvo, cuello relativamente largo, patas largas y figura esbelta. Su coloración es poco vistosa en el plumaje de invierno, con partes inferiores blancas y, en algunas especies, con punteado o estrías de color contrastante. Las partes superiores son grisáceas, a veces punteadas de blanco o de aspecto escamado. Ocasionalmente, al final de la época de migración, se pueden encontrar individuos en plumaje reproductivo, algo más vistoso que el plumaje de invierno. Recorren playas de arena y lodo, picoteando a profundidad variable según la longitud del pico. Todas las especies aquí descritas son migratorias transcontinentales.

**Andarríos Patiamarillo** (*Tringa flavipes*) (M). 27 cm. Se distingue del anterior por mayor tamaño, patas amarillas y, en vuelo, cola blanca con tenues barras oscuras. El pico es recto y de longitud aproximadamente igual a la cabeza. Muy gregario, con frecuencia se encuentra acompañado por la siguiente especie.

**Andarríos Mayor** (*Tringa melanoleuca*) (M). 33 cm. Muy similar al **Andarríos Patiamarillo**, incluyendo hábitos gregarios y el color de las patas y la cola. Se diferencia por su mayor tamaño, pico notablemente más largo que la cabeza y un poco recurvado (curvado hacia arriba).



1. Pellar, Caravana, 2. Chorlito Colirrojo, 3. Chorlito Collarejo,  
4. Chorlito Piquigrueso, 5. Chorlito Semipalmado.



**Andarríos Solitario** (*Tringa solitaria*) (M). 19 cm. Por encima grisáceo con fino punteado blanco. Anillo ocular blanco. Pecho y abdomen blancos, con un tenue estriado más oscuro en el pecho. Pico negro y recto y patas verdosas. Al volar muestra las timoneras centrales oscuras y las laterales blancas con barras transversales negras. Suele encontrarse en charcas temporales.


**Andarríos Maculado** (*Actitis macularia*) (M). 20 cm. Por encima pardo grisáceo uniforme y blanco por debajo. Superciliar blanquecina. Patas amarillentas. Cuello más corto que en los otros andarríos. Al volar muestra una lista blanca a lo largo de las alas. En plumaje reproductivo, al final de la época de migración, tiene el pecho y el abdomen densamente punteados de negro. Mientras camina "colea" arriba y abajo continuamente. Solitario.

**Vuelvepiedras** (*Arenaria interpres*) (M). 21 cm. Pico corto, agudo y ligeramente recurvado. Cuello y patas cortas. Partes superiores castaño, partes inferiores blancas, con amplia banda pectoral negra. En vuelo muestra dos listas alares blancas, rabadilla y cola blancas separadas por una banda negra. Su presencia en la Laguna de Sonso es ocasional y en general es raro en los humedales del interior.

**Correlimos Diminuto** (*Calidris minutilla*) (M). 15 cm. El más pequeño de los correlimos en la región. Patas amarillas y tamaño son distintivos. Por encima café grisáceo, partes inferiores blanquecinas, con tinte grisáceo y estrías tenues en el pecho. En el plumaje reproductivo los bordes de las plumas de la espalda son rufos y le dan un aspecto escamado. En vuelo muestra centro de la cola negro y lados de la rabadilla blancos. Generalmente en pequeños grupos

**Correlimos Pectoral** (*Calidris melanotos*) (M). 22 cm. Tamaño grande y cuello largo en comparación con los demás correlimos *Calidris*. Nítidamente estriado negro y rufo en la espalda. Pecho pardo grisáceo con estriado oscuro, denso y fino, en contraste marcado con el abdomen blanco. Cola en vuelo como en el Correlimos Diminuto.

**Correlimos Picudo** (*Calidris mauri*) (M). 16 cm. Pico negro y grueso en la base, ligeramente curvado hacia abajo (decurvado) en el extremo. Partes superiores grisáceas; partes inferiores blancas con marcas oscuras muy tenues en el pecho. Patas negras. En plumaje reproductivo la espalda es café rojiza con aspecto escamado. En vuelo la cola es como en las dos especies anteriores. Más común en las costas que en el interior.



1. Andarriós Mayor, 2. Andarriós Patiamarillo, 3. Andarriós Solitario,  
4. Andarriós Maculado.

