

CIGÜEÑUELAS Y AVOCETAS

RECURVIROSTRIDAE

Cigüeñuela (*Himantopus mexicanus*). 37 cm. La única especie de su familia en Colombia, es inconfundible por su llamativa coloración en blanco y negro, pico delgado, largo y agudo y patas rosadas muy largas. Se encuentra en bandadas muy ruidosas, a veces de varias decenas. Común en orillas del río y de la laguna.


GAVIOTAS Y CHARRANES

LARIDAE


En su mayoría son aves marinas aunque unas pocas especies se encuentran regularmente en grandes lagos y ríos. De alas largas, agudas y relativamente estrechas, su vuelo es ágil y versátil. Sus patas palmeadas les permiten nadar, aunque este no es su medio usual de locomoción. Las gaviotas son de pico robusto y ganchudo y cola redondeada, mientras que los charranes tienen pico relativamente largo, delgado y agudo y cola más o menos ahorquillada. Suelen congregarse en grandes números en donde el alimento es abundante y en sus sitios de reposo. En la laguna de Sonso sólo se registran ocasionalmente.

Charrán fluvial (*Sterna superciliaris*). 25 cm. Muy pequeña, con pico amarillo relativamente largo y patas amarillas. En plumaje reproductivo gris claro por encima; frente blanca y resto de cabeza y nuca, negro. Partes inferiores blancas. En vuelo exhibe cola ligeramente ahorquillada y una estrecha lista negra en el extremo del borde anterior del ala. El plumaje no reproductivo se diferencia por estrías negruzcas en la cabeza, en lugar de negro sólido. Aunque es un charrán tanto de los litorales como de grandes ríos, es muy raro en nuestra región.

Charrán Picudo (*Phaetusa simplex*). 38 cm. Pico amarillo, largo y robusto. Cabeza negra. Partes superiores grises y partes inferiores blancas. Patas verdosas. Cola corta y ligeramente ahorquillada. En vuelo exhibe las rémiges primarias negras y una extensa mancha blanca desde las secundarias hasta el borde anterior del ala. Se encuentra en ambos litorales y en los grandes ríos del oriente del país. Su presencia en la laguna de Sonso es ocasional.



1. Cigüeñuela, 2. Correlimos Pectoral, 3. Vuelvepiedras, 4. Correlimos Diminuto, 5. Correlimos Picudo.



Gaviota Reidora (*Larus atricilla*) (M). 40 cm. En plumaje no reproductivo, partes inferiores, cabeza y cola, blancas; en la parte posterior de la cabeza tiene algo de moteado oscuro. Partes superiores gris oscuro, casi negro en el extremo de las alas. Borde posterior de las alas blanco. En plumaje reproductivo la cabeza es negra, con párpados blancos.

PICOTIJERAS

RYNCHOPIDAE

Picotijera (*Rynchops nigra*). 45 cm. Cercano pariente de las gaviotas, el Picotijera se caracteriza por su pico largo y rojo, con el extremo negro, de mandíbula inferior notablemente más larga que la superior. Vuela a baja altura sobre el agua mientras corta la superficie con la mandíbula inferior; al hacer contacto con un pez, el Picotijera cierra el pico y lo captura. Por encima negro, con estrecha lista blanca en el borde posterior de las alas. Partes inferiores blancas. Ha sido registrado ocasionalmente en la Laguna de Sonso, pero fué común en otros humedales del Valle.

TORCAZAS, TORTOLAS Y PALOMAS

COLUMBIDAE

Todas las aves de esta familia corresponden en forma general y proporciones a la bien conocida paloma doméstica. La cabeza es relativamente pequeña, con pico corto y recto, el cuerpo robusto y las patas fuertes, igualmente adaptadas para posarse en los árboles y para andar por el suelo. El vuelo es potente y directo. Se alimentan de frutas, semillas y, ocasionalmente, de brotes tiernos de plantas

Torcaza Morada (*Columba cayennensis*). 30 cm. La mayor de las tórtolas de Sonso. Color general café rojizo, cabeza gris. Ojos rojos y piel desnuda alrededor de los mismos de igual color. Por lo general solitaria o en bandadas de unos pocos individuos. Vuela velozmente y a baja altura. Se posa en zarzas y otros arbustos en las áreas más húmedas.