

**Gaviota Reidora (*Larus atricilla*) (M).** 40 cm. En plumaje no reproductivo, partes inferiores, cabeza y cola, blancas; en la parte posterior de la cabeza tiene algo de moteado oscuro. Partes superiores gris oscuro, casi negro en el extremo de las alas. Borde posterior de las alas blanco. En plumaje reproductivo la cabeza es negra, con párpados blancos.

## **PICOTIJERAS**

---

### **RYNCHOPIDAE**

**Picotijera (*Rynchops nigra*).** 45 cm. Cercano pariente de las gaviotas, el Picotijera se caracteriza por su pico largo y rojo, con el extremo negro, de mandíbula inferior notablemente más larga que la superior. Vuela a baja altura sobre el agua mientras corta la superficie con la mandíbula inferior; al hacer contacto con un pez, el Picotijera cierra el pico y lo captura. Por encima negro, con estrecha lista blanca en el borde posterior de las alas. Partes inferiores blancas. Ha sido registrado ocasionalmente en la Laguna de Sonso, pero fué común en otros humedales del Valle.


## **TORCAZAS, TORTOLAS Y PALOMAS**

---


### **COLUMBIDAE**

Todas las aves de esta familia corresponden en forma general y proporciones a la bien conocida paloma doméstica. La cabeza es relativamente pequeña, con pico corto y recto, el cuerpo robusto y las patas fuertes, igualmente adaptadas para posarse en los árboles y para andar por el suelo. El vuelo es potente y directo. Se alimentan de frutas, semillas y, ocasionalmente, de brotes tiernos de plantas

**Torcaza Morada (*Columba cayennensis*).** 30 cm. La mayor de las tórtolas de Sonso. Color general café rojizo, cabeza gris. Ojos rojos y piel desnuda alrededor de los mismos de igual color. Por lo general solitaria o en bandadas de unos pocos individuos. Vuela velozmente y a baja altura. Se posa en zarzas y otros arbustos en las áreas más húmedas.



1. Picotijera, 2. Charrán Fluvial, 3. Charrán Picudo, 4. Gaviota Reidora,  
a. plumaje reproductivo, b. plumaje no reproductivo.



**Caminera Rabiblanca** (*Leptotila verreauxi*). 28 cm. Muy robusta. Café grisácea por encima; partes inferiores con tinte rosáceo con algo de blanco en garganta y abdomen. Piel alrededor de los ojos azul. Se levanta del suelo con aleteo ruidoso y zumbante y muestra extremo de la cola blanco excepto en las timoneras centrales. Se encuentra en potreros enmalezados y matorrales.

**Caminera Cabeziazul** (*Leptotila plumbeiceps*). 25 cm. Se distingue de la anterior por la cabeza azul plumizo y la piel alrededor de los ojos rojiza. Ojos amarillentos. Prefiere remanentes de bosque y arbolados densos.

**Tortolita Común** (*Columbina talpacoti*). 16 cm. Macho: café rojizo con rayas y puntos negros en las alas; cabeza azul grisáceo. Pico negro en el extremo. Timoneras laterales negras. Hembra: similar al macho excepto por su color más claro y menos rojizo. Busca alimento en el suelo, frecuentemente en los alrededores de las casas. Muy confiada.

**Torcaza Nagüiblanca** (*Zenaida auriculata*). 25 cm. Color general café claro, un poco más oscura por encima, con puntos negros grandes en las cobertoras alares y dos manchas negras a los lados de la cabeza. Al volar enseña los extremos blancos de las timoneras laterales. Gregaria y abundante, sobre todo en los cultivos de grano.

## LOROS Y PERICOS

---

### PSITTACIDAE

Una extensa familia bien caracterizada por su cabeza grande, pico corto y fuerte con la mandíbula superior aguda y fuertemente decurvada. Patas cortas pero fuertes, con dos dedos dirigidos hacia delante y dos hacia atrás (pata zigodáctila). Trepan con facilidad por troncos y ramas hasta alcanzar las frutas y semillas que constituyen su alimento.

**Periquito de Anteojos** (*Forpus conspicillatus*). 13 cm. El macho es verde, con «anteojos» azules; azul la rabadilla y parte de las alas, en estas últimas más visible en vuelo. Hembra toda verde. Abundantes en los cercos arbolados, a veces se congregan en grupos grandes y ruidosos. Anidan en agujeros en los troncos de los árboles y en estacones de cercos.