

**Caminera Rabiblanca** (*Leptotila verreauxi*). 28 cm. Muy robusta. Café grisácea por encima; partes inferiores con tinte rosáceo con algo de blanco en garganta y abdomen. Piel alrededor de los ojos azul. Se levanta del suelo con aleteo ruidoso y zumbante y muestra extremo de la cola blanco excepto en las timoneras centrales. Se encuentra en potreros enmalezados y matorrales.

**Caminera Cabeziazul** (*Leptotila plumbeiceps*). 25 cm. Se distingue de la anterior por la cabeza azul plumizo y la piel alrededor de los ojos rojiza. Ojos amarillentos. Prefiere remanentes de bosque y arbolados densos.

**Tortolita Común** (*Columbina talpacoti*). 16 cm. Macho: café rojizo con rayas y puntos negros en las alas; cabeza azul grisáceo. Pico negro en el extremo. Timoneras laterales negras. Hembra: similar al macho excepto por su color más claro y menos rojizo. Busca alimento en el suelo, frecuentemente en los alrededores de las casas. Muy confiada.

**Torcaza Nagüiblanca** (*Zenaida auriculata*). 25 cm. Color general café claro, un poco más oscura por encima, con puntos negros grandes en las cobertoras alares y dos manchas negras a los lados de la cabeza. Al volar enseña los extremos blancos de las timoneras laterales. Gregaria y abundante, sobre todo en los cultivos de grano.


## LOROS Y PERICOS

---


### PSITTACIDAE

Una extensa familia bien caracterizada por su cabeza grande, pico corto y fuerte con la mandíbula superior aguda y fuertemente decurvada. Patas cortas pero fuertes, con dos dedos dirigidos hacia delante y dos hacia atrás (pata zigodáctila). Trepan con facilidad por troncos y ramas hasta alcanzar las frutas y semillas que constituyen su alimento.

**Periquito de Anteojos** (*Forpus conspicillatus*). 13 cm. El macho es verde, con «anteojos» azules; azul la rabadilla y parte de las alas, en estas últimas más visible en vuelo. Hembra toda verde. Abundantes en los cercos arbolados, a veces se congregan en grupos grandes y ruidosos. Anidan en agujeros en los troncos de los árboles y en estacones de cercos.



1. Torcaza Morada, 2. Caminera Rabiblanca, 3. Tortolita Común,  
4. Caminera Cabeziazul, 5. Torcaza Nagüiblanca.



**Cotorra Cheja** (*Pionus menstruus*). 25 cm. Una lora más bien pequeña, toda verde excepto por cabeza y cuello azules, con una extensa mancha negruzca a los lados de la cabeza y las infracaudales rojas. Por lo general se encuentran en los chamburos y otros árboles grandes, en parejas o pequeñas bandadas hasta de 10 individuos.

## **CUCULILLOS, CUCOS Y GARRAPATEROS**

### CUCULIDAE

En general son aves de cuerpo delgado y cola larga y gradada, esto es, las timoneras son progresivamente más largas desde los lados hacia el centro de la cola. Tienen, al igual que las loras y carpinteros, patas zigodáctilas, aunque no son tan buenas trepadoras. Se alimentan de insectos y ocasionalmente de pequeños vertebrados.

**Cuclillo Migratorio** (*Coccyzus americanus*) (M). 30 cm. Café grisáceo por encima, incluida la cabeza hasta el nivel de los ojos, y algo rojizo en las alas. Partes inferiores blancas. Cola negra con grandes manchas blancas en el extremo de las timoneras. Mandíbula inferior amarilla. Es un migratorio de aparición más bien errática en la región entre septiembre y abril.

**Cuclillo de Antifaz** (*Coccyzus melacoryphus*). 25 cm. Se distingue del Cuclillo Migratorio por cabeza gris, extenso antifaz negro, pico negro y partes inferiores vicuña. Se encuentra generalmente en arbolados y rastrojos.

**Cuclillo Rabicorto** (*Coccyzus pumilus*). 20 cm. El más pequeño de su familia en la región. Partes superiores gris pardusco; garganta y pecho café rojizo en contraste con abdomen blanco. Cola negra, todas las timoneras con una mancha blanca en el extremo. Pico negro y ojos rojos. Busca insectos entre el follaje de árboles y arbustos.

**Cuclillo Enano** (*Piaya minuta*). 25 cm. Color general castaño rojizo, abdomen grisáceo. Pico amarillo y piel alrededor de los ojos roja. Cola larga con manchas blancas en el extremo de las timoneras. En rastrojos densos de madre viejas y orillas de la laguna.

**Garrapatero Común** (*Crotophaga ani*). 33 cm. Todo negro opaco, con aspecto escamado en pecho y espalda. Cola larga y pico arqueado. En potreros y matorrales, con frecuencia come junto al ganado. Muy gregario y ruidoso.