

VENCEJOS

APODIDAE

Aunque los vencejos se confunden fácilmente con las más familiares golondrinas, con observación más detallada los primeros se distinguen por su cuerpo alargado (en forma de cigarro) y alas muy largas y estrechas. Sus patas son en general pequeñas y débiles, suficientes apenas para soportar el peso del ave cuando se sujeta a un talud rocoso o a la corteza de un árbol. La coloración en la mayoría de las especies es muy sobria y oscura, aunque algunas muestran parches blancos y otras son parcialmente verdes o azul brillante. Son aves estrictamente insectívoras.


Vencejo de Collar (*Streptoprocne zonaris*). 20 cm. El mayor de los vencejos colombianos. Todo negro, excepto por un prominente collar blanco. A veces vuela en bandadas o forma grandes congregaciones que se elevan planeando merced a corrientes atmosféricas ascendentes.

COLIBRIES


TROCHILIDAE

Son inconfundibles por su plumaje radiante y su extraordinario vuelo que les permite permanecer suspendidos frente a las flores mientras liban el néctar. Algunos de ellos, con pesos inferiores a tres gramos, son los más pequeños entre las aves. El pico, aunque de curvatura y longitud muy variables según la especie, siempre es delgado y agudo, como conviene a su función de llegar hasta los nectarios sin ocasionar a las flores daño alguno. La lengua es un filamento largo y acanalado que sirve para coleccionar el néctar y conducirlo hasta la boca. Los colibríes llevan el polen de una flor a otra y por ello son importantes en la reproducción de muchas plantas. También incluyen en su dieta pequeños insectos.

Mango Pechinegro (*Anthracothorax nigricollis*). 10 cm. Pico ligeramente decurvado. Macho: partes inferiores negro terciopelo; partes superiores verde metálico; timoneras centrales verdes, las laterales púrpura bordeadas de negro. Hembra: en las partes inferiores presenta una lista negra desde la barbilla hasta el abdomen, bordeada de blanco a los lados; partes superiores verdes; cola como en el macho. A veces se congregan en gran cantidad alrededor de los chamburos en flor.



1. Mango Pechinegro, 2. Amazilia Coliazul, 3. Esmeralda Coliazul,
4. Cabeza de Rubí, 5. Amazilia Colirrufo.



Cabeza de Rubí (*Chrysolampis mosquitus*). 8 cm. Pico negro, relativamente corto, muy ligeramente decurvado y cubierto de plumas en su base. Macho: toda la cabeza rojo rubí intenso. Pecho, desde la barbilla, naranja dorado. Resto del plumaje café pardusco, cola castaño. El brillo extraordinario de su plumaje sólo se aprecia a plena luz y con el ángulo apropiado; en la sombra parece negro. Hembra: verde bronceo por encima, blanco grisáceo por debajo; cola castaño con amplia banda oscura en el extremo, las timoneras centrales verde bronceo. Es frecuente cuando hay chamburos en flor.

Esmeralda Coliazul (*Chlorostilbon mellisugus*). 7.6 cm. Muy pequeño, de pico recto y negro. Macho: todo verde, con cola azul acero, muy corta y ahorquillada. Hembra: verde por encima; pequeña lista blanca detrás del ojo y una mancha negruzca inmediatamente debajo; gris claro por debajo con un poco de verde en los flancos; cola azul acero con manchas blancas en el extremo de las timoneras.

Amazilia Coliazul (*Amazilia saucerottei*). 9 cm. Pico recto, la mandíbula inferior rojiza en la base y el extremo negro. Todo verde, excepto por cola azul acero, rabadilla bronce e infracaudales azul acero con márgenes blancos (a distancia las infracaudales se ven grisáceas). Común en zonas rurales y urbanas.

Amazilia Colirrufo (*Amazilia tzacatl*). 9 cm. Todo verde, el pico recto y rojizo. Cola café rojizo. Uno de los colibríes más comunes en zonas urbanas y rurales en la región. Visita gran variedad de plantas en flor.

MARTIN-PESCADORES

ALCEDINIDAE

Un grupo de aves con proporciones bien definidas: cabeza grande con cresta más o menos conspicua según la especie, pico largo, recto, agudo y robusto, patas zigodáctilas cortas y débiles y alas relativamente largas. Nuestras especies están muy asociadas a medios acuáticos y todas se alimentan de peces que capturan clavándose en el agua.

Martín-pescador Mayor (*Ceryle torquata*). 40 cm. Macho: Por encima gris azulado, con cresta prominente y rala; por debajo castaño rojizo, con un amplio collar blanco. Hembra: difiere por tener una amplia banda pectoral azul grisáceo con borde inferior blanco. Se posa en ramas expuestas a orillas de ríos y lagunas. Mientras vuela repite su llamada áspera («claclaclac...»).