

TREPADORES

DENDROCOLAPTIDAE

Tipicamente son aves de bosque, aunque algunas se encuentran en hábitat más abiertos siempre y cuando subsistan cercos arbolados. Recuerdan a los carpinteros por su hábito de trepar por los troncos y tienen las timoneras rígidas y agudas, aunque decurvadas en el extremo y no tan gruesas. Buscan insectos entre las grietas de la corteza y en las plantas epífitas, pero no perforan como los carpinteros. El color castaño es el predominante, con variedad de marcas como estrías, puntos, gotas y barras. La forma del pico es muy variable.

Trepador Campestre (*Lepidocolaptes souleyetii*). 20 cm. Castaño por encima. Cabeza y partes inferiores café claro con abundantes estrías blanquecinas, más finas en la coronilla y la nuca y prolongadas hasta la parte superior de la espalda. Pico amarillo, delgado, ligeramente decurvado y relativamente largo (2.5 cm).

HORNEROS, RASTROJEROS Y AFINES

FURNARIIDAE

Un gran familia de aves estrictamente centro y suramericanas, con gran variedad de formas, hábitos y preferencias ecológicas y de plumaje generalmente sobrio. La mayoría de las especies colombianas son propias de rastrojos densos. Se alimentan de insectos.

Rastrojero Pálido (*Synallaxis albescens*). 16 cm. Café grisáceo, excepto coronilla y hombros rufos. Barbilla negruzca. Cola larga y de aspecto deshilachado. En rastrojos densos, difícil de ver. Incesantemente llama «tuto, tuto...».

HORMIGUEROS, BATARAS Y AFINES

FORMICARIIDAE

Un grupo numeroso y muy variado de aves neotropicales. Pico fuerte y con un pequeño gancho en el extremo, alas cortas y redondeadas, cola corta y coloración a base de tonos de café, blanco y negro, dieta insectívora y preferencia por bosques y rastrojos, son algunas de las características comunes a esta familia, aunque para todas hay excepciones.



1. Batará Mayor, 2. Hormiguero Yeguá, 3. Rastrojero Pálido, 4. Batará Carcajada.

Batará Mayor (*Taraba major*). 20 cm. Macho: partes superiores negras, con dos barras alares blancas; cresta prominente; partes inferiores blancas. Hembra: rufa por encima y blanca por debajo. Ojos rojos en ambos sexos. En rastrojos densos a la orilla de madrevejas.

Batará Carcajada (*Thamnophilus multistriatus*). 16 cm. El macho es finamente barrado («habado») de blanco y negro en todo el cuerpo. La hembra es de color castaño por encima, las partes inferiores barradas blanco y negro. En árboles de follaje denso. El canto es como una carcajada rápida y corta («jajajajá-jajajajá»).

Hormiguero Yegúá (*Cercomacra nigricans*). 15 cm. Macho: todo negro, excepto por tres barras alares y mancha blanca en el hombro, no siempre visible; cola gradada, timoneras con extremos blancos. Hembra: gris pizarra, con marcas alares como en el macho y garganta con finas estrías blancas. En rastrojos altos y densos. Constantemente emite su llamada «ye-guá, ye-guá...»

COTINGAS, CABEZONES

COTINGIDAE

Esta familia incluye algunas de las aves más espectaculares por su plumaje, su canto o su comportamiento, entre ellas el Paragüero (*Cephalopterus penduliger*), el Campanero Barbado (*Procnias averano*) y el Toropisco (*Pyroderus scutatus*), así como muchas otras de colores apagados y por lo demás inconspicuas. Son en general moradoras de selvas, aunque unas pocas son propias de hábitat abiertos con árboles dispersos. En sus dietas incluyen frutas e insectos.

Cabezón Cinéreo (*Pachyramphus rufus*). 13 cm. Macho: en general gris, con coronilla negro lustroso y frente blanca; partes inferiores y lados de la cara gris más claro. Hembra: canela, con la coronilla castaño y las partes inferiores blanquecinas con tinte canela. En cercos arbolados y rastrojos altos a la orilla de madrevejas y cursos de agua.