

Con 183 especies, es la más numerosa de las familias de aves de Colombia. En su mayoría son de coloración no muy vistosa, principalmente a base de tonos de verde, café y amarillo, con abundantes excepciones (p.e., el Pechirrojo y la Viudita). Son por lo general insectívoros, pero algunas especies también consumen frutas.

**Tiranuelo Matapalos** (*Zimmerius viridiflavus*). 11 cm. Todo verde oliva; frente y cejas amarillas. Plumas remeras negruzcas, con bordes amarillos. Casi siempre comiendo frutos de los «matapalos».


**Tiranuelo silbador** (*Camptostoma obsoletum*). 10 cm. Muy pequeño, con cresta prominente. Pardo oliva por encima, más oscuro en la cabeza; ceja blanquecina muy tenue y línea ocular oscura; doble barra alar blanquecina. Garganta y pecho grisáceos, abdomen amarillo muy claro. Su canto es un «píiii-píiii-píiii...» descendente y quejumbroso. Busca en el follaje o hace cortos vuelos para capturar insectos al aire.

**Tiranuelo Murino** (*Phaeomyias murina*). 13 cm. Color general pardo grisáceo, un poco más claro en las partes inferiores, con dos barras alares claras y línea ocular blanquecina. Busca insectos en el follaje.


**Tiranuelo Coronado** (*Tyrannulus elatus*). 10 cm. Regordete, con pico muy corto. Partes superiores café oliva, más oscuro en la cabeza; línea ocular oscura; en la coronilla tiene una lista central amarilla, no siempre visible, delimitada lateralmente por dos listas negras; dos barras alares amarillas. Partes inferiores gris claro en garganta y pecho, amarillento en el abdomen. Hace cortos vuelos dentro del follaje en busca de insectos.

**Elaenia Copetona** (*Elaenia flavogaster*). 16 cm. Verde oliva por encima. Garganta y pecho oliva grisáceo claro, abdomen amarillento. Dos barras alares blanquecinas. Cresta prominente, generalmente erecta. Come insectos y frutas.

**Espatulilla común** (*Todirostrum cinereum*). 10 cm. Todo amarillo por debajo. Cabeza negra, espalda oliva. Ojos blancos. Alas negras con márgenes de las remeras amarillos. Cola delgada, con frecuencia erguida y muy móvil. Pico aplanado y muy ancho. Se desplaza muy rápidamente entre el follaje, moviendo la cola continuamente a lado y lado.



1. Espatulilla Rastrojera, 2. Espatulilla Común, 3. Atrapamoscas Oriental,  
4. Ealenia Copetona.



**Espatulilla Rastrojera** (*Todirostrum sylvia*). 10 cm. Muy similar en forma a la especie anterior. Verde oliva por encima, cabeza gris, bridas blancas; doble barra alar amarilla. Blanquecino por debajo, grisáceo en pecho y flancos. Menos abundante, más escondedizo y vive en vegetación más densa que el anterior.

**Atrapamoscas Oriental** (*Contopus virens*) (M). 15 cm. Oliva grisáceo en general, más claro en las partes inferiores. Dos barras alares blanquecinas. Cresta prominente, le da aspecto triangular a la cabeza. Se posa en chamizas a altura variable, captura insectos al aire y regresa a la percha original.


**Atrapamoscas Pechirrojo** (*Pyrocephalus rubinus*). 14 cm. También llamado «Titiiribí». El macho tiene pecho, abdomen y coronilla rojo escarlata; partes superiores negro hollín, incluida el área de los ojos. La hembra por encima es grisácea, las partes inferiores blanquecinas con rosa en los flancos y algunas estrías oscuras en el pecho. Se posa en perchas altas y expuestas y captura insectos al aire.

**Viudita Común** (*Fluvicola pica*). 13 cm. Coronilla, nuca, triángulo central de la espalda, alas y cola, negro. Todo el resto blanco. Siempre a la orilla de lagunas y pequeños cursos de agua.


**Atrapamoscas Ganadero** (*Machetornis rixosus*). 19 cm. Pardo oliva por encima, amarillo por debajo. Ojos rojos. Patas largas. Corre por el suelo en sitios con poca vegetación en busca de insectos, con frecuencia cerca de ganado. A veces se posa sobre vacas y caballos.

**Atrapamoscas Copetón** (*Myiarchus crinitus*) (M). 20 cm. Partes superiores gris pardusco, alas más oscuras con dos barras alares amarillo pálido; remeras y cola café rojizo. Garganta y pecho gris claro, abdomen amarillo. Cresta prominente. Un migratorio poco frecuente en la región, prefiere arbolados altos y densos.

**Bichofué Gritón** (*Pitangus sulphuratus*). 22 cm. Garganta blanca, amarillo el resto de partes inferiores. Coronilla negra circundada por una ancha diadema blanca. Parche amarillo en la coronilla sólo visible cuando levanta la cresta. Por encima café, más intenso en los bordes de las plumas de las alas y la cola. Pico robusto y prominente. Voz muy familiar e inconfundible en la región («piiito-juii!»).



1. Atrapamoscas Pechirrojo, 2. Atrapamoscas Copetón, 3. Viudita Común,  
4. Atrapamoscas Ganadero.



**Suelda Crestinegra** (*Myiozetetes cayanensis*). 16 cm. Muy similar en coloración a la especie anterior, pero de menor tamaño, pico mucho menos prominente y oliva sin tinte café en las partes superiores. Canto débil y quejumbroso, muy diferente al del Bichofué, .

**Tirano Tijereta** (*Tyrannus savana*). 38 cm. Partes superiores grises, cabeza y cola negras. Todo blanco por debajo. Cola muy larga, ahorquillada. Se posa expuesto, a veces en grandes números, en cercos, árboles y arbustos. Come frutas y caza insectos al aire.

**Tirano Migratorio** (*Tyrannus tyrannus*). (M). 22 cm. Muy similar a la especie anterior pero con cola normal y más oscuro en las partes superiores. La cola tiene un amplio margen blanco muy visible en vuelo. A veces se encuentra en grandes números, pero su presencia en la región es más bien errática. Se posa en árboles y arbustos.

**Sirirí Común** (*Tyrannus melancholicus*). 22 cm. Partes superiores gris oliva. Garganta gris, resto de partes inferiores amarillo claro. Se posa muy erguido y expuesto en ramas secas y altas, desde donde vuela para capturar insectos en el aire. Uno de los atrapamoscas más comunes en zonas urbanas y rurales.

## GOLONDRINAS

---

### HIRUNDINIDAE

Son un grupo bien conocido debido a la estrecha asociación de algunas especies con las viviendas humanas en pueblos, ciudades y áreas rurales. Las alas son relativamente largas, estrechas y agudas, adecuadas al vuelo rápido y ágil que le permite a las golondrinas la captura de pequeños insectos. El pico es pequeño y débil pero la boca es grande, como en los vencejos. La cola puede ser corta, cuadrada, escotada, o fuertemente ahorquillada.

**Golondrina Azul y Blanca** (*Notiochelidon cyanoleuca*). 13 cm. Por encima azul oscuro lustroso, toda blanca por debajo. La golondrina más común en las ciudades, anida en aleros y otras cavidades de las construcciones.

**Golondrina Barranquera** (*Stelgidopteryx ruficollis*). 13.5 cm. Por encima café claro, la rabadilla blanquecina. Por debajo grisácea, con un collar canela difuso. Más campestre que la anterior, es abundante en ambientes abiertos cerca de ríos y lagunas.