

**Reinita Trepadora (*Mniotilta varia*) (M).** Inconfundible por coloración y comportamiento. Estriada de blanco y negro en todo el cuerpo, excepto el abdomen que es blanco y sin marcas. La hembra tiene estriado más difuso y es más blanca debajo. Trepa por troncos y ramas gruesas.

**Reinita Tropical (*Parula pitiayumi*).** 10 cm. Por encima azul grisáceo con una mancha verdosa en la espalda. Dos barras alares blancas. Máscara negra (no muy visible). Por debajo amarillo intenso, con tinte naranja en el pecho. Abdomen blanco. Pico delgado y agudo. Se mueve rápidamente en árboles con follaje denso y abundantes quiches y barbas de viejo.

**Reinita Amarilla (*Dendroica petechia*) (M).** 10 cm. Amarilla, con pico y ojos negros, alas y cola negruzcas con bordes amarillos. En el macho, estrías rojas más o menos nítidas en pecho y flancos. Se mueve rápidamente por el follaje denso en busca de insectos.

**Reinita Naranja (*Dendroica fusca*) (M).** 13 cm. Negra por encima, con estrías blancas en la espalda y parche alar blanco. Frente, superciliar y garganta amarillo naranja. Abdomen blanco, flancos con estrías negras. Hembras y juveniles tienen el mismo patrón de coloración pero menos nítido y las áreas amarillas más pálidas que en el macho. Activa buscadora de insectos del follaje. Aunque es común en las laderas vecinas, su presencia en la Laguna es apenas ocasional.

**Reinita Enlutada (*Oporornis philadelphia*) (M).** 13 cm. Por encima gris oliva. Cabeza, garganta y pecho gris, en el macho con cantidad variable de negro en el pecho. Abdomen amarillo, patas rosadas. Se ve generalmente en arbustos y malezas cerca de arroyos, acequias y lagunas.

## MIELEROS


---

## COEREBIDAE

Como su nombre lo sugiere, este grupo incluye aves con marcada preferencia por el néctar, aunque sus adaptaciones para esa dieta son variadas. Algunas especies tienen pico delgado, relativamente largo y algo decurvado, en tanto que otras tienen picos ganchudos que les permiten romper las flores lateralmente para alcanzar el néctar.



1. Reinita Tropical, 2. Reinita Trepadora, 3. Reinita Enlutada, 4. Reinita Amarilla,  
5. Reinita Naranja.



**Mielero Común** (*Coereba flaveola*). 10 cm. Negruzco por encima, con superciliar blanca bien marcada. Garganta gris. Rabadilla, pecho y abdomen, amarillo. Pequeña mancha alar blanca. Común, busca insectos en el follaje y es muy adicto al néctar de las flores de chamburo.

## TANGARAS Y AFINES

---

### THRAUPIDAE

Cerca de 130 especies de los más variados y vistosos colores representan en Colombia a esta familia de aves, restringida en gran parte a los trópicos americanos. El pico es corto y cónico y tiene un pequeño diente, más o menos marcado, en el borde de la mandíbula superior. Aunque la mayoría son frugívoras, muchas especies añaden insectos a su dieta, principalmente en forma de larvas que encuentran en el follaje, mientras que otras liban néctar de las flores. En general las tångaras no tienen un canto propiamente dicho y limitan sus vocalizaciones a llamadas o reclamos muy simples.

**Eufonia Saturada** (*Euphonia saturata*). 11 cm. Macho: Extensa coronilla amarilla naranja; resto de partes superiores, lados de la cabeza, garganta y pecho, negro lustroso; partes inferiores naranja. Hembra: partes superiores verde oliva brillante, frente amarillenta; partes inferiores amarillo oliva. Se encuentra por lo general en el follaje de árboles altos.

**Eufonia Gorgiamarilla** (*Euphonia laniirostris*). 11 cm. Macho: Frente amarilla; partes superiores azul acero lustroso; todas las partes inferiores, desde la barbilla, amarillo brillante. Manchas blancas en el extremo de las timoneras laterales. Hembra: toda verde oliva, con tinte amarillento en el pecho. Se ve con frecuencia comiendo frutos de plantas parásitas («matapalos»).

**Tångara Rastrojera** (*Tangara vitriolina*). 14 cm. Color general azul verdoso claro, con máscara negra y coronilla café rojizo. Alas negruzcas con bordes azules en las remeras. En rastrojos y cercos arbolados.

**Azulejo Común** (*Thraupis episcopus*). 16 cm. En general azul grisáceo pálido, azul más intenso y brillante en la espalda, las alas y la cola. Común en rastrojos y cercos arbolados. Lleg a ser muy confiado si se le brinda fruta regularmente en los comederos.



1. Mielero Común, 2. Eufonia Saturada, 3. Eufonia Gorgiamarilla,  
4. Tangara Rastrojera.



**Asoma Candela** (*Ramphocelus flammigerus*). 19 cm. El macho es negro con rabadilla rojo escarlata. Pico azul claro. La hembra es café por encima con rabadilla naranja; por debajo amarilla con una banda pectoral naranja. Poco común en la Laguna de Sonso pero todavía puede encontrarse en antiguos cacaotales.

**Piranga Roja** (*Piranga rubra*) (M). 18 cm. Macho: todo rojo, un poco más oscuro en alas y cola; pico blanco-amarillento. Hembra: amarillo oliva, alas y cola más oscuras. A principios de año se encuentran algunos machos inmaduros moteados de rojo y amarillo, en proceso de obtener el plumaje del adulto. Busca insectos en el follaje y depreda avisperos.

**Piranga Alinegra** (*Piranga olivacea*) (M). 16 cm. Macho: en plumaje reproductivo, rojo escarlata con alas y cola negras; en plumaje no reproductivo, amarillo oliva y alas y cola negras. Hembra: toda amarillo oliva, con alas y cola negruzcas. En arbolados y rastrojos. Ocasional en la Laguna de Sonso.

**Pintasilgo Güira** (*Hemithraupis guira*). 13 cm. Por encima verde oliva, con rabadilla café rojizo; superciliar amarilla; garganta negra bordeada en el pecho por una franja amarilla; pecho café rojizo. Hembra: por encima verde oliva, rabadilla amarilla; plumas de alas y cola bordeadas de amarillo; superciliar amarilla tenue; lados de la cara y partes inferiores verde amarillento. En ambos sexos pico agudo amarillo. Más bien raro y poco visible pues suele moverse muy rápidamente entre el follaje de árboles altos.

## **SABANEROS, SEMILLEROS Y AFINES**

---

### FRINGILLIDAE

El pico corto, robusto y muy fuerte es una característica general para las aves de esta familia, la mayoría de las cuales se alimenta básicamente de semillas. Muchas especies, sin embargo, incluyen cantidades importantes de fruta en su dieta y casi todas alimentan a su crías también con insectos. En general prefieren hábitat abiertos y matorrales, aunque hay también unas pocas especies de bosque. Por lo demás existe dentro de la familia gran variación en coloración, tamaño y canto.