

Asoma Candela (*Ramphocelus flammigerus*). 19 cm. El macho es negro con rabadilla rojo escarlata. Pico azul claro. La hembra es café por encima con rabadilla naranja; por debajo amarilla con una banda pectoral naranja. Poco común en la Laguna de Sonso pero todavía puede encontrarse en antiguos cacaotales.

Piranga Roja (*Piranga rubra*) (M). 18 cm. Macho: todo rojo, un poco más oscuro en alas y cola; pico blanco-amarillento. Hembra: amarillo oliva, alas y cola más oscuras. A principios de año se encuentran algunos machos inmaduros moteados de rojo y amarillo, en proceso de obtener el plumaje del adulto. Busca insectos en el follaje y depreda avisperos.


Piranga Alinegra (*Piranga olivacea*) (M). 16 cm. Macho: en plumaje reproductivo, rojo escarlata con alas y cola negras; en plumaje no reproductivo, amarillo oliva y alas y cola negras. Hembra: toda amarillo oliva, con alas y cola negruzcas. En arbolados y rastrojos. Ocasional en la Laguna de Sonso.

Pintasilgo Güira (*Hemithraupis guira*). 13 cm. Por encima verde oliva, con rabadilla café rojizo; superciliar amarilla; garganta negra bordeada en el pecho por una franja amarilla; pecho café rojizo. Hembra: por encima verde oliva, rabadilla amarilla; plumas de alas y cola bordeadas de amarillo; superciliar amarilla tenue; lados de la cara y partes inferiores verde amarillento. En ambos sexos pico agudo amarillo. Más bien raro y poco visible pues suele moverse muy rápidamente entre el follaje de árboles altos.

SABANEROS, SEMILLEROS Y AFINES

FRINGILLIDAE

El pico corto, robusto y muy fuerte es una característica general para las aves de esta familia, la mayoría de las cuales se alimenta básicamente de semillas. Muchas especies, sin embargo, incluyen cantidades importantes de fruta en su dieta y casi todas alimentan a su crías también con insectos. En general prefieren hábitat abiertos y matorrales, aunque hay también unas pocas especies de bosque. Por lo demás existe dentro de la familia gran variación en coloración, tamaño y canto.



1. Azulejo Común, 2. Asoma Candela, 3. Piranga Roja, 4. Piranga Alinegra, 5. Pintasilgo Güira.



Azulón Ultramarino (*Cyanocompsa brissonii*). 16 cm. Macho: negro con visos azules; superciliar, frente, mejilla, hombros y rabadilla, azul. Hembra: café oscuro uniforme. En ambos sexos el pico es muy grueso. En matorrales densos a orillas de acequias y lagunas.

Saltátor Pío-judío (*Saltator albicollis*). 19 cm. Por encima verde oliva. Por debajo blanco con estrías oscuras en el pecho. Cejas cortas, blanquecinas. Pico muy robusto. El nombre de «Pío-judío» pretende imitar su canto. En rastrojos y arbolados.

Cardenal Pantanero (*Paroaria gularis*). 18 cm. Por encima negro-azul lustroso; cabeza y garganta rojo escarlata; banda ocular negruzca prolongada a los lados de la cabeza; ojos rojos. Partes inferiores blancas. Los juveniles, ocasionalmente numerosos, tienen la cabeza café claro. En árboles y malezas cerca de agua.

Semillero Cariamarillo (*Tiaris olivacea*). 10 cm. Macho: color general oliva; superciliares y garganta amarillo intenso sobre fondo negro; pecho negro. Hembra: en general oliva, con cejas y garganta amarillas apenas insinuadas. Come semillas de pastos altos, a veces colgado de las espigas.


Espiguero Gris (*Sporophila intermedia*). 11 cm. Macho: color general gris, un poco más claro en el pecho y blanquecino en el abdomen; mancha alar blanca; pico amarillo, corto y grueso. Hembra: café por encima, un poco más clara por debajo, pico similar al del macho. Se encuentra en pastizales, acompañado por otros de su mismo género.

Espiguero Capuchino (*Sporophila nigricollis*). 11 cm. El macho tiene una capucha negra hollín, verde oliva en espalda, alas y cola y oliva pálido debajo. Hembra café por encima, un poco más clara por debajo. En potreros y rastrojos bajos, a menudo con otros de su género.

Espiguero Ladrillo (*Sporophila minuta*). 10 cm. Macho: por encima café grisáceo, con pequeño parche alar blanco; rabadilla y partes inferiores canela rojizo. Hembra: café claro por encima, alas y cola más oscuras, con bordes pálidos en las remeras; partes inferiores café claro con algún tinte canela. En pastizales y malezas, a veces en bandada con otros espigueros.



1. Azulón Ultramarino, 2. Cardenal Pantanero, 3. Saltátor Pio-judío,
4. Semillero Cariamarrillo.



Volatinero Negro (*Volatinia jacarina*). 10 cm. Macho: azul negro lustroso, con pequeño parche blanco oculto en el dobléz del ala. Hembra: café por encima, partes inferiores un poco más claras y con abundantes estrías negruzcas en pecho y garganta. El pico es más fino en esta especie que en las demás de la familia. El macho se posa en una maleza baja y da pequeños saltos verticales mientras emite su llamada, lo cual, probablemente, forma parte de su ritual de cortejo o de su proclamación territorial.

Sicalis Coronado (*Sicalis flaveola*). 14 cm. Macho todo amarillo con frente y coronilla rojas. Hembra más opaca, grisácea, estriada de oscuro en espalda y alas, con una tenue banda pectoral amarilla; sin coronilla roja. En parejas o pequeños grupos en jardines y prados, frecuentemente en el suelo de caminos y carreteras.

Jilguero Aliblanco (*Spinus psaltria*). 10 cm. El macho es negro lustroso por encima, con un parche alar blanco y todo amarillo debajo. La hembra es oliva por encima, amarillo opaco por debajo y con parches alares blancos. Común en prados y jardines.



1. Espiguero Ladrillo, 2. Espiguero Capuchino, 3. Espiguero Gris, 4. Jilguero Aliblanco,
5. Volatinero Negro, 6. Sicalis Coronado.

